

## Macrostomia

### Transverse Cleft Lip: Macrostomy

**Kelvin Flores Arévalo,\* Yumana Bandy Nacif.\*\***



Neonato femenina de 5 días de vida que mostraba apertura bucal amplia asimétrica de aproximadamente con 6 cm de longitud, con succión débil en las primeras horas de vida que desapareció progresivamente. Todos los exámenes complementarios que se le realizaron, fueron normales. El tratamiento fue quirúrgico, evolución favorable; el proceso de deglución y fonación está conservado.

La macrostomía, es una hendidura orofacial

\* Médico Residente de segundo año del posgrado de Pediatría. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, UNAH-VS.

\*\* Pediatra Neonatóloga Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Dirigir correspondencia a: [kevindrone@gmail.com](mailto:kevindrone@gmail.com)

Recibido: 02 de junio 2015 Aprobado: 14 de junio 2015

entre el maxilar superior e inferior, derivada de alteración en el primer arco branquial, puede ser unilateral o bilateral. Es una malformación congénita autosómica recesiva, presente en 1 de 60,000 nacidos vivos especialmente varones. Está incluida en el grupo de enfermedades raras y su etiología es desconocida. Los problemas asociados incluyen falta de estética y problemas funcionales como dificultad para la alimentación, incoherencia en el habla y dificultad para soplar. Es importante realizar una minuciosa exploración física y realizar exámenes complementarios como ecografía transfontanelar y abdominal, serie ósea y ecocardiograma ya que suele asociarse a múltiples malformaciones congénitas.